

四庫全書

子部

欽定四庫全書

仁齋直指卷七

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

痰涎

痰涎方論

惟氣與血能生諸病痰亦如之夫痰者津液之異名人之所恃以潤養肢體者也血氣和平關絡條暢則痰散而無氣脉閉塞腠竅凝滯則痰聚而有痰之所以發動

者豈無自然而然哉風搏寒凝暑煩濕滯以至諸熱蒸鬱
啖食生冷煎煇鯉鱸鹹藏動風發氣等輩皆能致痰也
是痰作恙為喘為嗽為壅為嘔為眩暈為風癇為狂迷
為忪悸或吞酸或短氣或痞隔或腫脹或寒熱或疼痛
痰實主之人知痛生於氣血孰知痰涎流注亦能纏滯
而為痛乎如頭風證眉稜耳角俱痛投以風藥不效投
以痰藥收功如患眼證赤腫羞明而痛與之涼劑弗膠
與之痰劑獲愈如酒家手臂痛重時或麻痺二陳湯加

片子薑黃下白圓子消飲圓倍木圓輩每每就安如鬪
家胸骨撲傷刺痛無已散血之劑罔功續以自已溲便
飲之須臾吐痰其痛立止此皆痰涎作痛之明證也然
而頑痰滿胃上脘填塞其高者因而越之法當從權取
吐或者津液不守所以痰多吐甚痰脫則精竭而斃矣
療痰之法理氣為上和胃次之若風若寒若濕若熱如
前數者亦當推尋所受之因和胃謂何涎者脾之液也
脾胃一和痰涎自散故治痰多用半夏蓋半夏能利痰

故也

痰涎證治

橘皮湯治胸膈停痰

半夏

製五兩

茯苓

陳皮

各三兩

細辛

青皮

桔梗

枳殼

甘草

炒各二兩

人參

旋覆花

去葉各一兩

右剉散每服三錢薑五厚片煎服

前胡半夏湯治痰盛

北前胡

半夏

製

茯苓

各三分

陳皮

木香

訶蘇

枳殼

製

甘草

炒各二分

右剉散每服三錢薑五片烏梅少許煎服

人參飲治痰亦治嗽

人參

桔梗

半夏麴

五味子

細辛

枳殼

製

赤茯苓

各一分

甘草

炒半

右剉散每服三錢薑五片煎服痰嗽加熟地添甘草
星薑湯治痰去風

凡白南星

半兩者一箇

老生薑

三錢半

右各切片以水三盞磁器內煎取其半逐旋溫服

二聖飲治風痰

南星

半夏

各二兩切片

右用生薑一斤搗取自然汁浸藥磁器盛之頃在鍋

內隔湯熬炆令薑汁盡焙乾為末每挑二錢入生薑甘草少許煎湯調下或用糕糊小丸薑湯下三十丸入煨白礬少許同丸亦得

大半夏湯治痰飲

半夏

製

茯苓

生薑

等分

右剉碎每服三錢水二盞煎至一小盞溫服如熱痰加甘草少許胃不和去甘草加陳皮

半夏丸消下痰涎

丸白半夏

老生薑

等分搗如泥焙乾

右為末煮薑汁為糊丸桐子大每三十九薑湯下

豁痰丸治頑痰壅盛

南星

三兩

半夏

二兩各剉作大片用濃皂角水浸一宿焙乾為末

白附子

川靈脂

直僵蠶

炒去絲

華陰細辛

白礬

煨枯各一兩

全蝎

三錢半焙

右為末皂角漿煮麵糊為丸桐子大每二三十丸薑

湯下

神朮丸治痰飲妙

茅山蒼朮

一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾為末

生油麻

半兩水二盞研細取

漿

大棗

十五箇煮取肉研旂入麻漿拌和藥

右末為丸桐子大日乾每五七十丸空心溫湯下

辰砂化痰丸驅風化痰

辰砂

研細

白礬

煨枯各半兩

半夏麴

三兩

南星

炮一兩

右為末薑汁調麴煮糊丸桐子大別用朱砂衣每十

丸薑湯下小兒風痰一二丸

強中二薑湯溫脾胃消寒痰

良薑

乾薑

青皮

陳皮

大半夏

切開沸湯盪浸七次焙乾各一兩

南星

炮半兩

右為末薑汁調麴煑糊丸桐子大每三十九薑湯下
養正丹治腎虛氣不歸元痰涎上壅亦治寒痰每服二
十丸用降氣湯送下

二陳湯吞白丸子

方見小兒類

治痰飲一證眉心眉梁骨痛

狀如頭風

二陳湯

方見瘧類

加蒼朮片子薑黃製枳殼各少許治酒麪

積毒熱生痰攻眼腫痛

控痰良方喘嗽通用

號丹

白礬

各二兩

右以錢王搏刺一火孔先入號丹次以白礬蓋頂用炭一斤煅至火盡礬枯丹黑出火毒研細煮稀麪糊

九麻子大每服十五丸沸湯泡生薑汁送下諸頑痰
迷塞關竅不通聲音不出以三十丸研末入全蝎少
許用自然薑汁澄取清者調灌須臾吐痰立愈凡喘
促胃膈膨湃寸脉急數須從權吐之中滿內實而喘
者與解毒雄黃丸

方見積
熱門

附諸賢論

劉宗厚曰痰之為病仲景論四飲六證無擇叙內外三
因俱為切當蓋四飲則叙因痰而顯諸證者三因則論

其因有所傷而生痰者也惟王隱君論人之諸疾悉出於痰此發前人所未論可謂深識痰之情狀而得其奧者矣製滾痰丸一方絲治斯疾固為簡便較之仲景三因有表裏內外而分汗下溫利之法則疎濶矣況又有虛實寒熱之不同者哉夫痰病之原有因熱而生痰者亦有因痰而生熱者有因風寒暑濕而得者有因驚而得者有因氣而得者有因酒食而得者有因食積而得者有脾虛不能運化而生者有腎虛不能降火而生者

若熱痰則多煩熱風痰多成癰瘰奇證冷痰多成骨痺
濕痰多倦怠軟弱驚痰多成心痛癲疾飲痰多成脇痛
臂痛食積痰多成癖塊痞滿其為病狀種種難名王隱
君論中頗為詳盡學者但察其病形脉證則知所挾之
邪隨其表裏上下虛實以治之若夫子和謂飲無補法
必當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論熱藥治
痰之誤固為詳切亦有挾寒挾虛之證不可不論夫久
痰凝結膠固不通狀若寒凝不用溫藥引導必有拒格

之患況有風寒外來痰氣內鬱者不出溫散亦何以開
鬱行滯又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致
四肢百骸發為諸病理宜導去痰滯必當補接兼行又
難拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多
因食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰積所養飲
食雖少胃氣卒不便虛故也亦有治痰用峻利過多則
脾氣愈虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中
氣則痰自然運下此乃治本之法也謂醫中之王道者

正此類也

附諸方

金沸草散治外感風寒痰氣內鬱咳唾稠粘參蘇飲亦治外感風寒痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續

並見傷風門

小青龍湯治外感風寒內生溢飲支飲倚息喘

滿方見咳嗽門

蘇子降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛

方見諸氣門

中和丸治濕痰氣熱

蒼朮

黃芩

半夏

香附

等分

右為末粥丸如梧桐子大每服五七十丸薑湯下

導痰湯

南星

炮

橘紅

去白

赤茯苓

去皮

枳殼

麩炒

甘草

炙半兩
各一兩

半夏

四兩

右以咀水煎生薑五片食前服

茯苓圓

出千金
第一方

半夏

兩四

茯苓

兩二

枳殼

兩一

風化硝

兩半

右為末蒸餅或神麴薑汁糊丸梧子大每服三十丸

薑湯下

此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有效

清膈化痰圓

黃連

黃芩

兩各一

黃栢

山梔

兩半

香附

兩一

蒼朮

右為末蒸餅丸白湯下

搜風化痰圓

人參

槐角子

殭蠶

白礬

陳皮

去白

天麻

荊芥

各一兩

半夏

四兩薑汁炒

辰砂

半兩另研

右為末薑汁浸蒸餅為丸辰砂為衣服四拾丸薑湯下

利膈化痰圓

南星

蛤粉研細一兩

半夏

瓜蒌仁

貝母去心治胸膈痰氣妙香附半兩童便浸

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角搗杏仁如泥入前藥搜和再入薑汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛為衣每服五六十丸薑湯下

清痰圓治清中脘熱痰積

烏梅

枯礬

黃芩

蒼朮

陳皮

活石

炒

青皮

枳實

各半兩

南星

半夏

神麴

山查

乾生薑

香附

各一兩

右為末湯浸蒸餅丸服

王隱君滾痰圓

括曰甌裏翻身甲掛金于今頭戴草堂深相逢二八
求斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸桐

子意常斟千般怪証如神効水瀉雙身却不任

大黃

酒蒸

黃片苓

酒洗淨各八兩

沉香

半兩

礞石

一兩槌碎焰硝一兩用入小砂罐內瓦片蓋之鉄線線定鹽泥固濟晒乾火煨紅候冷取出

一方加珠砂二兩

研為細末為末

右為細末水凡梧子大每服四五十丸量虛實加減服茶清溫水任下臨臥食後服

六君子湯治脾虛不進飲食嘔吐痰水

方見調理脾胃門

清氣化痰圖清頭目涼膈化痰利氣

半夏

湯洗七次二兩

陳皮

去白

茯苓

去皮各一兩半

薄荷葉

荊芥穗

各五錢

黃芩

酒浸炒

連翹

梔子仁

炒

桔梗

去蘆

甘草

炙各一兩

蒼朮

酒浸到焙乾炒

香附子

醋浸炒各一兩

右為末薑汁煎水打糊為丸如梧子大每服五十丸
食後臨卧各一服如腸胃燥實加酒炒大黃芒硝各
一兩

此方即二陳湯涼膈散加香附蒼朮相合是也蓋痰者因火而動氣者因鬱而成故作胸膈痞滿頭目昏眩今用二陳湯以豁痰涼膈散以降火而散風熱香附蒼朮開鬱順氣何疾之不愈哉

節齊化痰圖

論曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清熏蒸成聚而變為痰焉痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾

古人用二陳湯為治痰通用者所實脾燥溫治其標也然以之而治溫痰寒痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被鬱故其津液之隨氣而升者為火薰蒸凝濁鬱結而成歲月積久根深蒂固故名老名鬱而其源則火邪也病在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃溫痰冷痰飲痰涎之比也故湯藥難治

亦非半夏茯苓蒼朮枳殼南星等藥所能治也惟在
開其鬱降其火清潤肺金而消化凝結之痰緩以治
之庶可取効今製一方於後

天門冬

去心

黃芩

酒炒

海粉

別研

瓜蒌仁

別研

橘紅

各一兩

桔梗

去蘆

連翹

香附子

搗研淡鹽水
浸炒各五錢

青黛

別研
二錢

芒硝

別研
三錢

右為細末煉蜜入生薑汁少許和藥末杵極勻丸如

小龍眼大噙化一九或嚼爛清湯細嚥之或丸為細
丸如黍米大淡薑湯送下五六十丸

此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺
與胃脘皆受火邪故鬱滯而成此方用天門冬黃芩
泄肺火也海粉芒硝鹹以軟堅也瓜蒌仁潤肺降痰
香附米開鬱降氣連翹開結降火青黛解鬱火故皆
不用辛燥之藥

秘傳豁痰丸治食積痰熱

陳皮

去白
四兩

山查

神麴

各二
兩

當歸

黃芩

白朮

各四
兩

半夏

薑汁浸
七日

黃連

白茯苓

甘草

各一兩
五錢

枳實

二兩
五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服四五十
丸臨卧或食後淡薑湯送下

秘傳滾痰圓降痰火神効

大黃

八兩剉片用皮硝三兩酒
一碗水一碗和勻蒸乾用

黃芩

八兩剉碎用
明礬三錢酒

水各一
碗蒸用

沉香五錢

礞石一兩用硝一兩入礞固濟

煨紅取
出用

硃砂一兩研末為衣

右為細末水丸如梧桐子大硃砂為衣每服四五十

丸量虛實加減

加味二陳湯

半夏薑汁一錢五分

白茯苓

白朮各一錢

香附一錢二分

連翹

黃芩

枳實麩炒

前胡

甘草

瓜蒌仁

桔梗

麥芽

神麴

炒

陳皮

鹽水浸炒
各一錢

右呖咀水二盞薑三片煎一盞

五飲湯

按粹方

一留飲心下二癖飲脇下三疼飲胃中四

溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草

各等分

右剉每兩分四服水二盞生薑十片同煎至六分取
清溫服不拘時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加
芎根葛花砂仁

蠲飲枳實圓

板粹方

逐飲消痰導滯清膈

枳實

炒

半夏

湯泡七次

陳皮

去白各二兩

黑牽牛

半斤取頭
末三兩

右為末水煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸薑湯

下食後

辰砂祛痰丸

聖惠方

治酒食過多酸醎作成痰飲聚於胸

中凝則嘔逆惡心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深
則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神効

硃砂

一兩水飛一半
入藥一半為衣

半夏

四兩

槐角

炒

陳皮

白礬

生

荊芥

各一兩

生薑

四兩與半夏
製作餅陰乾

右為末薑汁打糊丸如梧桐子大每服五十九生薑

湯下

八味圓治脾腎兩虛痰唾而不咳者

方見諸
虛門

五虎湯治痰喘氣急

方見
喘門

水飲

水飲方論

水之與飲同出而異名也人惟脾土有虧故平日所飲

水漿不能傳化或停於心下或聚於脇間或注於經絡
或溢於膀胱往往因此而致病矣孰謂血氣痰涎能生
諸疾而水飲之不能為恙乎惟水與飲漉漉有聲為喘
為咳為嘔為泄為痞隔為脹滿為眩運為怔忡為寒熱
為堅痛為浮腫為多唾為短氣為體重氣為飲隔痞滿
腹鳴骨痛冷痺則曰氣分經脉不行血化為水四肢紅
腫則曰血分凡此等類皆水氣之所由作也據病驗證
可不究其所受之原乎然則療治之法將何先曰能以

表裏虛實訂之斯得矣表有水者其身熱噉喘怔忡乾
嘔微利青龍湯汗之而愈裏有水者其身涼嘔噉痞滿
引脇痛硬十棗湯下之而安虛者脉虛心腹滿而濡當
以安腎圓為主加青木香圓少許以行之實者脉實心
腹滿而硬當以青木香圓為主用五皮散加枳殼以導
之尋常水氣心下怔忡大半夏湯小半夏茯苓湯五苓
散輩通用可也然而瘧家多積黃水或於心下停滯或
於脇間結癖惟癖為能生寒熱所以瘧劑多用常山蓋

水在上焦則吐之水不在於上焦則常山亦能破其癖而下其水也若夫水腫證候亦此種類詳見於後請旁參而互攷焉

水飲證治

芎夏湯逐水利飲通用

川芎

半夏製

茯苓各一兩

青皮

陳皮

枳殼製各半兩

白朮

甘草炒各一分

右劉散每服三錢薑五厚片煎服川芎半夏能逐水也。喘加去節麻黃。嗽加炒桑白皮。嘔加生薑半夏。泄加蒼朮白朮。痞隔加枳殼桔梗。脹滿加縮砂白豆蔻。眩運加半夏南星。怔忡加白茯苓。寒熱疼痛下其癖浮腫體重滲其濕餘以類推。

大半夏湯

方見痰涎門

小半夏茯苓湯治諸水氣

半夏

製五兩

茯苓

三兩

右判散每服三錢水二盞半煎一盞秤生薑二錢半
研取汁入藥煎沸溫服

五苓散流行水飲

方見氣門

每二錢沸湯調下小便更不利

加防已佐之

桂木湯治氣分前證

辣桂

三兩

白朮

麻黃

去節

細辛

去苗

甘草

炒各二兩

枳殼

製

乾薑

炮各一兩半

右劉散每服三錢煎服

桂苓湯治血分前證

辣桂

赤茯苓

當歸

川芎

赤芍藥

蓬莪朮

京三稜

檳榔

蒼朮

炒

桑白皮

炒

大腹皮

瞿麥穗

青皮

陳皮

甘草

炒各半兩

葶藶

大黃

濕紙煨各一分

右劉散每服三錢薑五片煎服

平肺湯肺與腎皆以至陰積水喘嘈嗽咳蓋水乘之

葶蘆

微炒

桑白皮

炒

北梗

枳殼

葉

紫蘇莖葉

半夏

製各一兩

麻黃

去節三分

甘草

炒半兩

右劉散每三錢薑五片煎服治腎水用青木香圓

青龍湯治表不解有水氣發熱乾嘔怔忡咳嗽微喘微

利

麻黃

去節

細辛

芍藥

乾薑

炮

甘草

炒

辣桂

各三兩

五味子

二兩

半夏

製二兩半

右剉每服三錢水一盞半煎一盞溫服

十棗湯治表解裏有水身涼汗出乾嘔短氣微嗽微利
胸下痞滿引脇硬痛

芫花

炒

大戟

甘遂

等分

右件異篩秤末合和入乳鉢研良久以肥棗十箇擘

開用水一碗煮爛取汁一盞調藥壯者服一錢重弱者服半錢重平旦溫服別用棗湯漱下通利即以糜粥自養未利明日再服半錢請酌量用

安腎圓治腎氣不足膀胱虛冷

川烏

炮去皮臍

辣桂

各四兩

茯苓

白朮

石斛

酒炒

白茯苓

剉炒去

巴戟

從蓉

酒浸焙

桃仁

去皮尖微炒

萆薢

山藥

破故紙

炒各十兩

右末煉蜜圓如桐子每五七十圓鹽湯空心服

青木香圓行滯通水

青木香

五兩

萆澄茄

補骨脂

炒

檳榔

炒各十兩

牽牛

六十兩炒香搗取木三十兩

右為末滴水圓菉豆大每二十圓熟水下

五皮散治皮膚水氣

方見諸氣類

二和散和暢三焦治痞脹浮腫

方見諸氣類

消飲圓

茯苓

乾薑

炮各
三兩

白朮

八兩

枳實

炒半
兩

右末煉蜜圓桐子大每十五圓米飲下

倍朮圓

白朮

四兩

辣桂

乾薑

炒各
二兩

右為末煉蜜圓桐子大每服二十圓米飲下此二藥
可以溫中消水

嘔吐

嘔吐方論

嘔吐出於胃氣之不和人所共知也然有胃寒有胃熱有痰水有宿食有膿血有氣攻又有所謂風邪入胃凡是數者可不究其所自來哉寒而嘔吐則喜熱惡寒四肢淒清法當以剛壯溫之熱而嘔吐則喜冷惡熱煩燥口乾法當以溫涼解之痰水證者唾沫怔忡先渴後嘔與之消痰逐水輩宿食證者胸腹脹滿醋悶吞酸與之消食去積輩腥氣燥氣熏炙惡心此膿血之聚經所謂

嘔家有癰膿不須治膿盡自愈是兩七情內鬱關隔不平此氣攻之證經所謂諸鬱干胃則嘔吐是兩若夫風邪入胃人多不審率用參朮助之攔住寒邪於此尤關利害其或惡聞食臭湯水不下粥藥不納此則翻胃之垂絕者也辯之不早其何以為對治乎雖然足陽明之經胃之絡脉也陽明之氣下行則順今逆而上行謹不可洪固也然嘔吐者每每大便秘結上下壅遏氣不流行蓋思所以區畫而利導之他如汗後水藥不入口者

逆嘔而脉弱小便復利身微熱而手足厥者虛寒之極也識者憂焉

嘔吐證治

附子理中湯治寒證嘔吐

方見寒類

二薑湯治寒證嘔吐

良薑

生白薑

各半兩

木香

丁香

各二錢半

甘草

炙一錢半

右剉散每服三錢水薑半煎半食前服

吳茱萸湯治冷涎嘔吐陰證乾嘔通用

吳茱萸

沸湯泡洗
三次焙炒

生薑

各一兩半

人參

三分

大棗

五箇

右剉細每服四錢水盞半煎半食前服

小柴胡湯多加生薑治熱證嘔吐

方見血類

人參須依分兩

用或加烏梅亦得

大半夏湯治痰證嘔吐

半夏

製到二兩

人參

四錢切片

右每四錢薑七片蜜少許熟煎服

小半夏茯苓湯治水氣嘔吐

方見水飲門

金匱云嘔家用半

夏以去其水水去則嘔止

治中湯治食證嘔吐

人參

白朮

乾薑

炒

甘草

炙

青皮

橘紅

等分

右剉每服三錢棗一枚煎服積聚大便秘者加大黃

二碁子許

二陳湯

方見
壅類

加縮砂丁香治宿食嘔吐

地黃湯治膿血嘔吐

生地黄

洗
焙

川芎

各一
兩

半夏

製

甘草

炙各
三分

南星

盪洗
七次

芍藥

白芷

茯苓

北梗

前胡

知母

人參

各半
兩

右剉每服三錢半薑五片烏梅一箇煎服

加減七氣湯治氣鬱嘔吐

半夏

製二兩半

人參

辣桂

厚朴

製各一兩

茯苓

一兩半

甘草

炙半兩

右剉散每三錢半薑七片棗一枚煎服加木香亦得

霍香正氣散治風邪入胃嘔吐

半夏麴

川厚朴

製各三兩

霍香葉

橘紅

各一兩

甘草

炙七錢

右剉散每三錢薑七片棗一枚食前煎服又養胃湯

方見
寒類通用

木香豆蔻散治翻胃嘔吐

人參

木香

肉豆蔻

麵裹煨
各半兩

白豆蔻仁

一分

甘草

炒一錢半

右麤末每三錢薑棗煎服

參橘湯治翻胃

人參

真橘紅

石蓮肉

各半兩

透明乳香

一錢半

右末每一錢薑湯點服

丁香煑散治翻胃嘔逆

丁香

石蓮肉

各十枚

北棗

七枚
截碎

生薑

七片

黃秫米半合洗

右水碗半煮稀粥去藥取粥食之

附子散治弱證翻胃

大附子

一枚作兩截中心各刻小孔入丁香四十粒塞滿以竹針插入炭火煨四

圓 滓薑汁半碗再滓再滓以盞為度去皮切焙

右並末每一錢半粟米一捻北棗二箇煎食前服

養正丹大治停寒留飲聚涎翻胃嘔吐

方見病冷門

添薑煎

二陳湯下

嘔吐家多大便秘結虛冷者用靈砂或養正丹溫而利

之又蘇合香圓

方見嗽門

用四分感應圓

方見脹滿門

用六分夾

研作細圓薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便熱結用蜜

煮凝捻作指鉞納後部導之或用獐猪膽一枚取汁入

法醋少許以筆蘸滴灌於後部或燒皂角於桶內熏穀

道或用連根葱白一握漢椒五十粒搗細作餅焙熱和

輕粉掩臍續以葱椒煎湯熏盪身下

翻胃方

橘皮湯治翻胃嘔吐

真橘皮

用日照西方壁土炒香取橘皮為末

右每二錢薑棗略煎服

連子散治翻胃

右石蓮肉為末入些肉豆蔻末米湯乘熱調服二方

患痢禁口通用

溫胃散治久冷翻胃

附子

一箇生去皮臍分作四塊生薑半斤水一大碗慢火同煮至半盞取附子切焙

右為末每一錢空心溫米湯調下

附諸方

加味二陳湯治停痰氣結而嘔

半夏

泡

陳皮

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩半

砂仁

一兩

丁香

五錢

生薑

三兩

右呔咀每服一兩水煎服

附膈噎

膈噎方論

能飲食而能便下無斯病矣飲食不下而便稍秘則膈噎成焉皆由患憂氣結思慮傷脾以致津液枯澇而飲食不能下下則便秘不通復而上行也內經曰三陽結謂之膈子和云三陽者大小腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脉燥大腸熱結則不能圉膀胱熱結則津

液涸三陽既結則前後閉滯不通必反而上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下推而上行也故經又曰少陽所致為嘔湧溢食不下此理明矣嚴氏曰五噎五膈者由喜怒不常七情傷於脾胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下蓋氣留於咽嗌者則成五噎結於胸膈者為五膈五噎之名憂思勞食氣也五膈之名憂悲寒熱氣也其病令人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨碍飲食夫喜怒憂鬱內傷脾肺肝氣愈盛痰火上升血液

瀝薑汁開鬱以神麴香附潤氣以杏子麻仁燥以白蜜
乳汁血虛以當歸地黃之類其間倘服燥熱過多津液
枯瀉腸胃燥結尿如羊矢者不治丹溪云年高者不治
無血故也不守戒忌厚味房勞之人亦不可治張雞峰
曰噎是神思間病惟內觀自養可治此一言深中病情
可不信哉

秘傳枳朮二陳湯治痰氣食膈嘔吐痰涎翻胃嘈雜

白朮

泔洗剉土
炒一錢

黑枳實

麩炒

陳皮

去白各
八分

茯苓

去麤皮

香附子

童便浸炒

半夏

湯泡七次各一錢

黃連

薑汁炒

檳榔

雞心者

白荳蔻

各五分

青皮

麩炒

吳茱萸

生甘草

各三分

右吹咀用水一鍾半薑三片棗一枚煎八分食遠服

氣虛者加人參黃芪血虛者加當歸地黃鬱加神麴

撫芎

秘傳半夏厚朴湯治翻胃吐痰胸滿肋痛嘈雜吐涎

半夏

湯泡七次

厚朴

薑汁製

山梔

去皮炒黑

川黃連

薑汁炒
各一錢

廣陳皮

去白
八分

茯苓

去麁皮
八分

甘草

生用
三分

黑枳實

麩炒
一錢

蒼朮

泔浸炒
八分

澤瀉

香附子

青皮

各五分

當歸

白豆蔻

各六分

右㕮咀用水一鍾半薑三片煎八分不拘時服

瓜蒌實圓

和劑方

治膈噎胃膈痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蒌實

去殼
別研

枳殼

去穰
麩炒

半夏

湯泡
七次

桔梗

炒各
一兩

右為細末薑汁米糊為丸如梧桐子大每服五十丸
生薑湯送下

人參利膈丸

東垣方

治膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘

滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香

檳榔

各七錢半

人參

當歸

藿香

甘草

枳實

楚炒黃各一兩

大黃

酒濕蒸熟

厚朴

薑製一兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十丸溫水

下

五膈寬中散治七氣留滯飲食不下穀脹氣脹通用

撞氣阿魏圓治五種噎疾九般心痛痞瘕氣塊冷氣攻

刺

並見諸氣門

參苓白朮散治脾胃虛弱不能運化

白朮和胃丸

八珍湯治證同前

寬中進食丸滋形氣美飲食

已上並見調理脾胃門

保和丸消食開胃

方見積聚門

橘杏麻仁圓治噎膈大便燥結

橘皮

炙

杏仁

去皮尖

麻仁

去殼各三兩

郁李仁

去殼五錢

右除陳皮為末三仁俱搗成膏用棗仁去核以石枳
內三味搗和丸如梧桐子大每服五六十丸煎枳實
湯送下食前服

謹按膈噎翻胃之証皆由七情太過而動五臟之火

薰蒸津液而痰火益盛脾胃漸衰飲食不得流利為
膈為噎為翻胃也矣丹溪云年高者不治蓋年少之
人氣血未虛用藥却去痰火調其脾胃病不復矣年
老之人氣血已虛用藥却去痰火雖得暫愈其病立
復所以然者氣虛則不能運化而生痰血虛則不能
滋潤而生火也又云此証切不可用香燥之藥而厚
滋味蓋證屬熱燥固不用香燥之藥香能散氣燥能
耗血而滋味助火而生痰也有等庸工但見斯疾不

察病因便以峻劑投入而取刻效圖以厚賄不思病危復而不救可不嘆哉

附痞滿

痞滿方論

丹溪云痞者有食積兼濕東垣有法有方心下痞須用枳實炒黃連如稟受充實面蒼骨露氣實之人而心下痞者枳實黃連青皮陳皮枳殼如稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者宜白朮山查神麴麥芽陳皮如

肥人心下痞者乃有實痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石
瘦人心下痞乃是溫熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻
如食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草豆蔻吳茱萸
砂仁痞挾血成窠囊用桃仁紅花香附大黃之類難知
云傷寒痞者從血中來從外之內從無形雜病痞者亦
從血中來從內之外從有形故無形以苦泄之有形以
辛散之又有虛實之殊如實痞大便秘厚朴枳實主之
虛痞大便利芍藥陳皮主之飲食所傷而為痞滿者當

用藥消導其胸中窒塞欲吐者則宜吐之有氣不運化及陰虛損血者以補虛之劑調之但世俗不明此理往往例用峻快藥下之復痞或致危篤者多矣

活人桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼

去穢炒
各三兩

右剉水二盞煎至一盞去滓分作二服

半夏瀉心湯治汗下後身寒痞滿而嘔飲食不下

半夏

半升
洗

黃芩

乾薑

人參

三兩

黃連

一兩

大棗

十二枚

甘草

三兩
炙

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

仲景大黃黃連瀉心湯治心下痞

大黃

二兩

黃連

一兩

右剉以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

黃連消痞丸

拔粹方

黃連

炒一兩半

黃芩

炒三兩

枳實

一兩錢

乾生薑

三錢

茯苓

白朮

炒

甘草

炙各五錢

片薑黃

一錢半

陳皮

七錢半

澤瀉

一錢

半夏

泡一兩三錢半

猪苓

五錢

砂仁

三錢半

厚朴

製五錢

右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸溫白湯送下

消痞丸

板粹方

黃連

六錢炒

神麴

炒五錢

黃芩

刮黃色六錢

薑黃

白朮

各一兩

人參

四錢

甘草

炙二錢

縮砂仁

三錢

橘皮

四錢

乾生薑

二錢

枳實

麤炒黃色五錢

猪苓

二錢半

一方加澤瀉厚朴

各三錢

半夏

湯泡七次五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七十九

白湯下

枳實消痞丸

枳實

黃連

各五錢

乾生薑

二錢

半夏麴

三錢

厚朴

四錢

人參

三錢

甘草

炙二錢

白朮

三錢

茯苓

麥芽

各二錢

右為末水浸蒸餅丸如梧子大每服三十五丸溫水

下

橘連枳朮丸

白朮

三兩
去梗

枳實

一兩
去
穢麴炒

陳皮

黃連

酒浸炒
各一兩

右為末荷葉煮湯打米糊為丸如梧子大每服五十丸食後服

橘皮枳朮丸

脾胃論

治老幼元氣虛弱飲食不消臟腑不

調心下痞悶

枳朮丸

脾胃論

治痞消食強胃

並見內傷門

瓜蒌實丸

濟生方

治胸痞痛徹背脇喘急妨急

方見膈噎門

加味補中益氣湯治內傷心下痞

方見內傷門

有痰而痞加半夏黃連四肢滿閉便難而心下痞加

柴胡黃連甘草大便秘燥加黃連桃仁少加大黃當
歸心下痞腹脹加五味子砂仁芍藥嘔逆者加黃連
生薑陳皮冬月加黃連丁香藿香食已心下痞別服
橘皮枳朮丸如不能食心下痞者勿加止服本方主
之

附嘈雜

嘈雜方論

丹溪云嘈雜是痰因火動治痰為先薑汁炒黃連入痰

藥用炒山梔子黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛嘈雜此乃食鬱有熱炒山梔薑炒黃連不可無肥人嘈雜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒山梔子嘈雜若濕痰氣鬱不喜食三補丸加蒼朮倍香附子醫按蔣氏子條云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而止又云眩運嘈雜是火動其痰二陳湯加梔子芩連之類戴云此則俗謂之心嘈也

二陳湯

方見
痰類

三補丸

方見
損門

附吞酸

吞酸方論

內經云諸嘔吐酸皆屬於熱又云少陽之勝嘔酸原病
式云酸者肝木之味也由火勝制金不能平木則肝木
自甚故為酸也如飲食熱則易於酸矣是以肝熱則口
酸也或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸故
俗醫主於溫和脾胃豈知人之傷於寒也則為病熱蓋
傷寒皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱而為熱故傷寒熱在

表以麻黃湯熱藥發表使腠理開通汗泄熱退而愈也
凡內傷冷物者或即陰勝陽而為病寒或寒熱相搏而
致腸胃陽氣怫鬱而為熱亦有內傷冷物而反病熱得
汗泄身涼而愈也或微而吐為中酸俗謂之醋心法宜
溫藥散之亦猶解表之義若久喜酸不已則不宜溫之
宜以寒藥下之後以涼藥調之結散熱去則氣和也所
以中酸不宜食粘活油膩者謂能令氣鬱不通暢也宜
食糲食采蔬能令氣通利也

丹溪云或曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒何也
予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津
液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火
化遂作酸味非熱而何其有鬱積之久不能自湧而出
伏於肺胃之間咯不得上咽不得下肌表得風寒則內
熱愈鬱而酸味刺心肌表溫煖腠理開發或得香熱湯
丸津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱者言其本
也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作

收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治濕熱鬱結之法為未合經意予嘗治吞酸用黃連萊萸各炒隨時令迭其佐使蒼朮茯苓為輔佐湯浸炊餅為小丸吞之仍告以糲食蔬菜自養則病易安

藿香安胃散

方見脾胃門

加減二陳湯治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因食生冷

脾胃不和

丁香

一兩

半夏

陳皮

各五兩

茯苓

三兩

甘草

一兩半

右咬咀每服四錢水煎入生薑三片煎服

麴朮丸治中脘宿食留飲酸蜚心痛或口吐清水

神麴

炒三兩

蒼朮

泔浸炒一兩半

陳皮

一兩

右為末生薑汁煮神麴為丸每七十丸薑湯下

黃連清化丸

黃連

一兩

吳茱萸

浸炒一錢

桃仁

二十四箇研

陳皮

半兩

半夏

一兩半

右為末神麴糊丸菜豆大每服百丸薑湯下

丹溪經驗方

茱萸

一兩去枝梗煮少時頃半日晒乾

陳皮

蒼朮

朱泔浸

黃連

陳壁土炒去土秤

黃芩

如上土炒

桔梗

茯苓

各一兩

右為末神麴糊丸菜豆大每服二三十九時時津液

下食後服

附六鬱

六鬱方論

鬱者六氣血食痰濕熱結聚不得發越當升不得升當降不得降者是也丹溪云血氣冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉故人身諸病多生於鬱或久病而生鬱矣戴氏曰氣鬱者胸脇疼痛脉沉而澁血鬱者四肢無力能食便紅脉沉扎結食鬱者噯酸腹飽不喜飲食人迎脉平氣口緊盛痰鬱者動則喘息寸脉沉滑濕鬱者周

身走痛或關節疼痛遇陰寒而發脉沉細緩熱鬱者瞀
悶尿赤脉沉而數內經曰五鬱者金鬱泄之謂滲泄解
表於小便也木鬱達之謂吐之令其條達也水鬱折之
謂抑之制其衝逆也火鬱發之謂汗之令其疎散也土
鬱奪之謂下之無壅礙也此所謂六鬱者或七情之鬱
遏或寒熱之交侵故為九氣怫鬱之候或雨濕之侵凌
或酒漿之積聚故謂留飲濕鬱之疾熱鬱而成痰痰鬱
而成癖血鬱而成癥食鬱而成痞滿此必然之理也

丹溪治六鬱方法

氣鬱

香附

童便浸

蒼朮

朱泔浸

撫芎

濕鬱

白芷

蒼朮

川芎

茯苓

痰鬱

海石

香附

南星

薑製

瓜蒌

一本無南星瓜蒌
有蒼朮川芎梔子

熱鬱

山梔

炒

青黛

香附

蒼朮

撫芎

血鬱

桃仁

去皮

紅花

青黛

川芎

撫芎
亦可

香附

食鬱

蒼朮

香附

山查

神麴

炒

針砂

醋炒七次
研極細

諸鬱春加芎夏加苦參秋冬加吳茱萸

凡藥在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假令食在氣上氣升則食降餘倣此

越麴丸

神麴

炒

香附

童便浸
一宿

蒼朮

川芎

越梔

炒各
等分

右為細末水九葉豆大每服五七十丸溫水下

六鬱湯解諸鬱

陳皮

去白一錢

半夏

湯泡七次

蒼朮

米泔浸

撫芎

各錢

赤茯苓

梔子

炒各七分

香附

二錢

甘草

炙半錢

砂仁

研細五分

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞溫服

○如氣鬱加烏藥木香檳榔訖蘇乾薑倍香附砂仁

○如濕鬱加白朮倍蒼朮○如熱鬱加黃連倍梔子

○如痰鬱加南星枳殼小皂莢○如血鬱加桃仁紅
花牡丹皮○如食鬱加山楂神麴麥蘖麴

升發二陳湯治痰鬱火邪在下焦大小便不利此藥能
使大便潤而小便長

陳皮

去白

撫芎

茯苓

各一錢

半夏

一錢半

升麻

防風

甘草

柴胡

各五分

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫

服

升陽散火湯治熱鬱

方見火門

火鬱湯

方見積熱門



仁齋直指卷七

欽定四庫全書

子部
仁齋直指卷八

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱 鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄舉人臣曹夢齡

欽定四庫全書

仁齋直指卷八

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

咳嗽

咳嗽方論

江流滔滔日夜無聲狂瀾激石不平則鳴所以咳嗽者
痰塞胸膈氣逆不平衡擊而動肺耳然亦何以致此哉
曰感風傷冷挾熱受濕淤血停水與夫肺實肺虛皆能

壅痰而發嗽也夫肺為嬌臟外主一身之皮毛內為五臟之華蓋形寒飲冷最易得寒燥氣鬱蒸最易生熱惟其易為冷熱所以內外交侵動則邪氣窒塞矣此非不平而鳴乎感風者鼻塞聲重傷冷者淒清怯寒挾熱為焦煩受濕為纏滯瘀血則膈間脛悶停水則心下怔忡或實或虛痰之黃白唾之稀稠從可知也治嗽大法肺脉浮為風邪所客以發散取之肺脉實為氣壅內熱以清利行之脉濡散為肺虛以補肺安之其間久嗽之人

曾經解利以致肺胃俱冷飲食不進則用溫中助胃加
和平治嗽等輩至若酒色過度虛勞少血津液內耗心
火自炎遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連續
而不已惟夫血不榮肌故邪在皮毛皆能入肺而自背
得之尤速此則人參芎歸所不可無一種傳注病涉邪
惡五臟反尅毒害尤深近世率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝
丹砂雄黃安息香蘇合香圓通神之劑然則咳嗽證治
於此可以問津索途矣抑猶有說焉肺出氣也腎納氣

也肺為氣之主腎為氣之藏凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能收氣歸元也當以補骨脂安腎圓主之母徒從事於寧肺。諸氣諸痰咳嗽喘壅之煩須用枳殼為佐枳殼不惟寬中又能行其氣氣下痰下他證自平

咳嗽證治

華蓋散治肺感風寒痰壅咳嗽

麻黃

去節

紫蘇子

炒

杏仁

去皮尖炒

橘紅

桑白皮

炒

赤茯苓

各一兩

甘草

炙半兩

右細剉每服二錢半薑棗煎食後服隨意加製半夏

添薑煎

加減麻黃湯治肺感寒邪咳嗽

麻黃

去節一兩

辣桂

甘草

炙各半兩

杏仁

五十枚去皮尖微炒別研

陳皮

半夏

製各半兩

右細剉拌和杏仁每三錢訖蘇三葉薑四片煎服

溫肺湯治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫

乾薑

辣桂

甘草

炙

半夏

製

陳皮

北五味子

杏仁

去皮尖
各一兩

細辛

阿膠

炒各
半兩

右麤散每二錢半薑棗煎服

三物湯治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃

不去
節

杏仁

不去皮尖
各一兩

甘草

不炙
半兩

右劉散每二錢半薑五片煎服

金沸草散治上壅熱嗽

荊芥穗

二兩

旋覆花

去梗

麻黃

去節

北前胡

各一兩半

半夏

製

赤芍藥

甘草

炒各半兩

右細剉每二錢半加炒葶蘆半錢薑四片煎服如咽
喉焦燥加朴硝食後又治傷風鼻塞涕流壅嗽若聲
啞嗽不止兼服人參欬花膏

人參款花膏

款冬花

紫苑茸

洗去土
炒用

人參

北五味子

桑白皮

炒等
分

右為末煉蜜圓小彈大含化一圓或淡薑湯嚼下若

身熱口乾兼服天麻防風圓

天麻防風圓

人參

天麻

防風

各一
兩

全蝎

炒

直僵蠶

炒各
半兩

硃砂

研

雄黃

研

甘草

炙各
一兩

牛黃

錢一

麝

字一

右細末煉蜜圓桐子大每二圓紫蘇薄荷湯嚼下

清肺飲治肺氣上熱咳嗽

前胡

荊芥

桑白皮

炒

甘草

炙

枳殼

製各
三分

知母

貝母

去心
炒

腦荷

赤茯苓

北梗

紫蘇

阿膠

炒

杏仁

去皮

天門冬

去心各半兩

右剉散每三錢薑三片烏梅一枚食後煎服如更內

實與解毒雄黃圓

方在積熱門

黃連阿膠圓治肺熱或咯血

黃連

淨三兩

赤茯苓

二兩

阿膠

炒一兩

右黃連茯苓同末水調阿膠和衆手圓桐子大每三十圓食後米飲下黃連赤茯苓能抑心火則肺得其清

不換金正氣散治傷溫咳嗽方見寒類加赤茯苓生乾薑煎

服

大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽咯血嘔血

阿膠

炒熱

地黃

淨

白茯苓

北五味子

山藥

各一兩

貝母

去心炒

百部

栢子仁

茯苓

丹參

杜仲

去麋皮剉炒

麥門冬

去心各半兩

遠志

浸去心炒

人參

防風

各一分

右細末煉蜜圓彈子大每一圓少水略煎食後臨卧服或金沸草散加腦荷煎湯嚼下凡嗽藥不效覺胸膈腥悶乃宿血乘肺黑豆入紫蘇生薑煎汁與之

桑皮散治上焦有熱壅血腥悶嗽聲連併氣不得透

腦荷

北梗

川芎

防風

桑白皮

炒

黃芩

北前胡

柴胡

紫蘇

赤茯苓

枳殼

製各一分

甘草

炙一分半

右剉細每三錢薑棗煎服或喫梨亦可

小青龍湯治表證水氣身熱嗽喘乾嘔怔忡十棗湯治

裏有水氣身涼咳痞滿脇痛藥証

方見水飲門

真武湯治少陰腎證水飲與裏寒合而作嗽腹痛下利

白茯苓

白朮

白芍藥

各一兩

熟附子

半兩

右剉散每二錢半加生乾薑細辛五味子各半錢薑

三片食前服凡年高氣弱久嗽通用仍間服養正丹

補肺湯治肺虛氣乏久嗽

阿膠

炒

真蘇子

北梗

半夏

製

甘草

炙各半兩

款冬花

紫苑

細辛

杏仁

去皮焙

陳皮

桑白皮

炒

青皮

縮砂仁

五味子

石菖蒲

草果

各一分

右剉散每三錢薑四片紫蘇三葉煎服

理中圓補肺止寒嗽

人參

乾薑

白朮

甘草

炙等分

右末煉蜜圓彈子大每一圓加炒阿膠五味子煎服

加味理中湯治肺胃俱寒咳嗽

人參

白朮

乾薑

炒不

甘草

炙

半夏

製

茯苓

橘紅

細辛

北五味子

等分

右細劉每服二錢半薑棗煎食前服曾經解利者通用

養胃湯

方見寒類

人參款花膏

方見前

二藥兼服治肺胃俱寒

作嗽或煎人參飲嚼下大阿膠圓亦可

人參飲咳嗽痰壅通用

人參

北梗

半夏麴

五味子

細辛

枳殼

製

赤茯苓

杏仁

不去皮各一分

甘草

炙半

右細劉每三錢薑五片烏梅半箇食後煎服

養肺湯治肺壅上氣痰嗽

人參

紫苑

赤茯苓

杏仁

皮不去

真蘇子

陳皮

桑白皮

炙

款冬花

半夏麴

北梗

甘草

炙等分

右為麤末每三錢薑四片烏梅半箇食後煎服寒者

加桂

寧嗽湯諸嗽通用

桑白皮

炒

紫蘇

細辛

北五味子

橘皮

半夏

梔

茯苓

杏仁

去皮

縮砂仁

枳殼

製

北梗

甘草

炒等分

右剉散每三錢薑四片烏梅半箇食後煎服
人參潤肺散治咳嗽喘急痰壅鼻塞

麻黃

去節

杏仁

去皮
麩炒

貝母

去心
麩炒
各一兩

人參

阿膠

炒

甘草

炙各半兩

橘紅

北梗

各一分

右麤末每二錢半熬蘇三葉煎服亦能發散小兒通用

冷嗽寒痰方橘皮半夏湯大七氣湯夾和每三錢薑七片棗二箇同煎吞白圓子三十粒

加味半夏茯苓湯治痰多咳嗽

半夏

製二兩半

茯苓

一兩半

陳皮

五味子

各一兩

人參

細辛

甘草

炙各半兩

右剉散每四錢薑七厚片煎服

南星散治風氣動痰發嗽

生南星

一兩

枳殼

製

細辛

各半兩

木香

甘草

炙各一分

右吹咀每服三錢薑七厚片慢火熟煎服

人參芎歸湯治虛勞少血津液內耗心火自炎燥熱乘

肺咳嗽咯血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽

當歸

川芎

白芍藥

各二分

人參

半夏

製

橘皮

赤茯苓

阿膠

炒

細辛

北五味子

甘草

灸各一分

右剉每服三錢薑四片棗二箇煎服

人參芎歸湯大阿膠圓

方見前

煎服治腎虛勞嗽

人參胡桃湯夾和定肺湯

方見前門

治勞氣喘急

七寶散治肺痿勞嗽久嗽

人參

款冬花

鍾乳石

鴛管石

並生研

胡礬

煅各二錢

辣桂

甘草

各一錢

右細末臨卧以少許嚥下兩次

黃耆建中湯

方見濕門

加半夏麴生乾薑五味子同煎空心吞

安腎圖

方見水飲門

治腎經虛寒咳嗽痰唾而色黯黑小腹

動氣作痛

消膿飲治肺有癰膿腥氣上衝嘔吐咳

生南星

一兩

知母

貝母

去心炒

生地黃

阿膠

炒

川芎

桑白皮

炒

甘草

炙各三分

防風

射干

北梗

天門冬

去心

腦荷

杏仁

不去皮

半夏

製

紫蘇葉

白芷

白及

各半兩

右剉散每四錢薑七片烏梅一箇食後煎服

雄黃散治傳症勞嗽肺管有虫令人喉癢

雄黃

安息香

各一分

露蜂房

去子燒灰

桃仁

去皮炒各二分

麝香

少許

右為末每用一錢生艾葉入生蜜研汁夾和臨卧含化仍燒艾以管子吸煙熏喉

蘇合香圓

安息香

二兩別為末用無灰酒一升熬膏

蘇合香油

一兩入安息膏

內

白朮

丁香

青木香

白檀香

沉香

萆撥

香附

淨

苛子

煨取肉

烏犀

鎊屑

硃砂

研末飛各二兩

薰陸香

龍腦

研各一兩

麝香

一兩半

右為細末入研藥拌和用安息香膏并煉白蜜和劑
每一大圓沸湯化下前氣血風類後諸痛嘔逆類並
用此

咳逆方

蘇合香圓用丁香柿蒂煎湯調下

噫逆即咳逆胃寒所致也良薑為要藥人參白茯苓佐之良薑溫胃能解散胃中風邪

安腎圓

方見諸虛門

凡咳嗽暴重覺氣從臍下逆奔而上者

蓋腎虛氣不歸元補骨脂安腎圓主之

附諸方

參蘇飲治上膈有熱咳嗽聲重

方見傷風門

五物湯

治風寒咳嗽肺氣喘急

治風寒咳嗽肺氣喘急

麻黃

不去節

杏仁

不去皮

甘草

生用

荊芥穗

桔梗

各等分

右以咀薑三片同煎溫服咽痛甚者煎熟後加朴硝

少許一方去桔梗荊芥用半夏枳實等分

人參荊芥散

濟生方

治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言

語不出咽乾項強鼻流清涕

陳皮

去白

荊芥穗

桔梗

半夏

湯洗七次

細辛

洗去土

甘草

炙

人參

杏仁

去皮尖

通草

麻

去根節

右吹咀每服四錢水盞半薑五片煎八分食後溫服

消風百解散

和濟方

治咳嗽聲重身熱頭疼

方見傷風門

加減三奇湯

東垣方

治咳嗽上氣喘促胸膈不利

枳梗

陳皮

甘草

青皮

人參

紫蘇

桑白皮

各五錢

半夏

七錢

杏仁

三錢

五味子

錢四

右㕮咀每六七錢入薑煎服

加減瀉白散

東垣方

治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘

急

桑白皮

一兩

地骨皮

錢七

陳皮

青皮

五味子

人參

各五錢

白茯苓

錢一

右㕮咀每服半兩水煎入粳米二十粒

人參五味子散

聖惠方

治男女老稚諸虛百損氣血勞傷

涎喘欬膿或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏

一切虛損

人參

五味子

桔梗

白朮

白茯苓

甘草

炙

熟地黃

當歸

焙半兩

地骨皮

前胡

去苗

桑白皮

炒

枳殼

去穰炒

黃芪

炙

陳皮

去白

柴胡

各三錢

右吹咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服食後服日三次煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎尤妙

諸般嗽不已

粟殼

製

烏梅

去核

陳皮

去白

人參

去蘆

木香

五味子

桔梗

炒

杏仁

去皮尖炒

石膏

甘草

右呔咀每服八錢蘆水二盞煎至八分去滓溫服食後

止嗽烟筒方

冬花蕊

鴛管石

雄黃

艾葉

各等分

右為末用帛捲筒內用火點烟入口內吞下就用水吞一口以塞烟氣立効

加味人參薤苑散治虛勞咳嗽

大寧嗽湯勞嗽諸嗽通用神効

並見虛勞門

咳嗽治例

出明醫雜著

王節齋曰咳謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰咳嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺生氣而聲出也須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也

主方

杏仁

去皮尖

白茯苓

各一錢

橘紅

七分

五味子

桔梗

甘草

各五分

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏各一

錢

麥門冬

炒

黃芩知母

各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛涼解散加防風薄荷

紫蘇炒黃芩麥門冬

各一錢

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒

黃芩麥門冬石膏

各一錢

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮

各一錢

防

風黃芩山梔

各五錢炒

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生乾

薑防風

各一錢

肺經素有熱者再加酒炒黃芩知母

各五分

若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎前胡

柴胡

各一錢

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星

薑汁炒

濕痰脾困

少食加白朮蒼朮有痰而口燥咽乾勿用半夏南

星宜加知母

蜜水拌炒

貝母瓜蒌仁黃芩

炒

若夏月熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母石膏

上半日嗽者胃中有火加貝母石膏黃連五更嗽者

同治

黃昏嗽者火浮於肺不宜正用寒涼藥宜加五味子

訶子皮欬而降之

若咳嗽久肺虛滋氣補血加人參黃芪阿膠當歸生

薑天門冬款冬花馬兜鈴酒芍藥之類肺熱咳嗽
去人參用沙參此兼補氣血也

若午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火如川芎
當歸芍藥熟地黃黃柏知母竹瀝薑汁天門冬瓜
萋仁貝母此專補陰血也

若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶子皮
炒香附瓜萋仁半夏麴海石青黛黃芩為末蜜調
為丸噙化仍服前補陰降火湯藥失治則成勞

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒌仁貝母海石青
黛半夏麴軟石膏山植子枳實薑炒黃連為末蜜
調嚥化

若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑
白皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血
多是肺受熱邪氣得熱而變為火火盛而陰虛不
得安寧從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參等
甘溫補氣之藥然亦有氣虛而咳血者則宜用人

參黃芪款冬花之藥但此等證不多耳

因咳而有痰者款為重主治在肺因痰而致款者痰為重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致款嗽只治其痰消其積而款自止不必用肺藥以治嗽也

針灸法風門二穴

在背二椎下各開寸半

肺俞二穴

三椎下各寸半

三里

二穴

見前

附肺痿肺癰

肺痿方論

金匱曰熱在上焦者因欬為肺痿得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液故得之寸口脉數其人欬口中反有濁唾涎沫者為肺痿若口中辟辟燥咳即胸中隱隱痛脉反滑數此為肺癰欬唾膿血脉數虛者為肺痿數實者為肺癰欬傷肺葉成也丹溪云宜補血養肺養氣清金虛者用人參平肺散治之

紫苑散

方 板粹

治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參

桔梗

茯苓

各一錢

知母

貝母

各一錢半

紫苑

甘草

阿膠

炒各五分

五味子

十五粒

右呖咀水煎服一云各等分水二盞生薑三片煎至

一盞食前服

人參平肺散

方 拔粹

治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰

涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

桑白皮

炒一兩

知母

七錢

甘草

炙

地骨皮

各半兩

青皮

五味子

三百箇

茯苓

人參

各四錢

陳皮

去白半兩

天門冬

去心四錢

如熱加黃芩

四錢

紫蘇葉半夏

各半兩

右吹咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分去滓

溫服或為末薑汁丸彈子大噙化亦得食後

知母茯苓湯

宣明方

治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓

甘草

炙各一兩

知母

五味子

人參

去蘆

薄荷

半夏

洗七次

柴胡

去苗

白朮

款冬花

桔梗

麥門冬

去心

黃芩

各半兩

川芎

阿膠

各二錢炒

右吹咀每服一兩水二盞生薑十片煎至一盞去滓

通口服食後

生薑甘草湯

千金方

治肺痿咳嗽涎痰不止咽燥而渴

生薑

五兩

人參

二兩

甘草

四兩

大棗

十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

七寶散治肺痿勞嗽久嗽

方見前咳嗽門

保和丸

葛氏方

治勞嗽肺成痿者服之決効

潤肺膏

葛氏方

治久肺燥成痿

並見勞瘵門

葶歷大棗瀉肺湯治肺癰喘不得卧

葶歷

熱令黃色搗凡如彈子大

大棗

十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶歷煮取一升

頓服

桔梗湯

金匱方

治欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁

唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗

二兩

甘草

二兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也

桔梗湯

濟生方

治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤澀

桔梗

去蘆

貝母

去心膜

當歸

去蘆酒浸

瓜蒌子

枳殼

去穰
麩炒

薏苡仁

炒

桑白皮

蜜水
炙

防己

各二
兩

黃芪

去蘆一
兩半

甘草節

生
用

杏仁

去皮尖
麩炒

百合

蒸各
半兩

右呖咀每服五錢水盞半生薑五片煎八分不拘時服如大便秘加大黃小便赤少加水通

消膿飲治肺癰膿腥氣上衝而嘔欬嗽

方見前
咳嗽門

針灸法肺俞二穴

穴法
見前

膻中一穴

在兩乳相係玉下一
寸六分又名元兒仰

取之

喘嗽

喘嗽方論

肺主氣也一呼一吸上升下降榮衛息數往來流通安有所謂喘惟夫邪氣伏藏癡涎浮湧呼不得呼吸不得吸於是上氣促急填塞肺腕激亂爭鳴如鼎之沸而喘之形狀具矣有肺虛挾寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣鬱肺脹而喘者又有胃絡不和喘出於陽明之氣逆真元耗損喘生於腎氣之

上奔如是等類皆當審證而主治之肺虛肺寒必有氣
乏表怯冷痰如水之證法當溫補如官桂阿膠之類是
也肺實肺熱必有壅盛胸滿外閤上炎之狀法當清利
如桑白皮葶藶之類是也水氣者漉漉有聲怔忡浮腫
與之逐水利小便如小半夏茯苓湯五苓散輩驚憂者
惕惕悶悶引息鼻張與之寬中下氣如四七湯桔梗枳
殼湯輩陽明之氣下行今逆而上行古人以通利為戒
如分氣散蘇飲指迷七氣湯加半夏二陳湯加縮砂施

之為當真陽虛憊腎氣不得歸元固有以金石鎮墜助陽接真而愈者然亦不可峻驟且先與安腎圓八味圓輩否則人參煎湯下養正丹主之雄黃麻黃馬兜鈴漢防已雞內金諸品非不主喘也如前治法大要究其受病之原至若傷寒發喘表汗裏下脚氣喘滿疏導收功此則但療本病其喘自安圓機之士可以舉隅而反矣雖然喘有利下而愈者亦有因瀉而殂者喘有數年沉痾而復瘳者亦有忽因他疾大喘而不救者汗出髮潤

喘者為肺絕身汗如油喘者為命絕直視譫語喘滿者不治諸有篤病正氣欲絕之時邪氣盛行多壅逆而為喘然則喘之危惡又安可以尋常目之

喘嗽證治

九寶湯經年喘嗽通用常服屢效

麻黃

去節

橘紅

腦荷

各一兩

辣桂

紫蘇

桑白皮

炒

杏仁

去皮尖

大腹子

連皮

甘草

炙各半兩

右細剉每服三錢薑五片烏梅一箇水煎食後臨卧服或入童子小便半盞同煎尤妙

定肺湯治上氣喘嗽

訖苑茸

北五味子

橘紅

杏仁

去皮尖
略炒

甘草

炙

真蘇子

炒

桑白皮

炒

半夏

製

枳殼

梨等
分

右細剉每三錢薑五片訖蘇五葉食後煎服

調降湯治喘嗽

枳殼

製一兩

半夏

製

北梗

青皮

陳皮

真蘇子

檳榔

茯苓

葶藶

隔紙炒各半兩

木香

白豆蔻仁

縮砂仁

紫蘇葉

各二錢半

甘草

炙三分

右剉散每三錢薑五片煎服

杏蘇飲治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉

二兩

五味子

大腹皮

烏梅肉

杏仁

去皮尖各一兩半

陳皮

北梗

麻黃

去節

桑白皮

炒

阿膠

炒各三分

訶苑

甘草

炒各一兩

右咬咀每三錢薑五片煎服

五味子湯治寒喘

北五味子

杏仁

去皮熬炒

橘紅

各一兩

麻黃

去節一兩半

甘草

炙

生乾薑

辣桂

各半兩

右麤末每服二錢半蘇三葉煎服肺虛加炒阿膠喘甚加馬兜鈴

人參胡桃湯治肺虛發喘氣乏

人參

一寸揀者

胡桃肉

二箇去殼不去皮

右切碎薑錢五片棗二枚食後臨卧煎服蓋人參定喘帶皮胡桃欽肺夷堅志方

三物湯

方見咳漱門

寒證喘者加生乾薑辣桂熱證喘者加

葶藶腦荷煎畢入朴硝少許

玉華散清肺定喘

甘葶蘆

焙香

桑白皮

炒

天門冬

去心

馬兜鈴

半夏

製

紫苑

杏仁

去皮尖

貝母

炮

百合

人參

各半兩

百部

甘草

炙各一分

右劉散每服二錢半薑四片大棗三枚煎服

小青龍湯

方見水飲門

本方去麻黃加杏仁去皮三兩治水

氣喘嗽若小腹滿更加茯苓

郁李仁圓治水氣乘肺動痰作喘身體微腫

葶藶

隔紙炒

杏仁

去皮尖

防已

郁李仁

炒

真蘇子

陳皮

赤茯苓

各半兩

右末煉蜜圓桐子大每三四十圓食後生薑煎蘇湯

下

神祕湯治水氣作喘

陳皮

北梗

紫蘇

人參

五味子

檳榔

桑白皮

炒

半夏

製

甘草

炙等分

右剉散每服三錢薑五片煎服

小半夏茯苓湯五苓散

方見水飲門

四七湯治驚憂氣遏上喘

半夏

製二兩半

茯苓

二兩

厚朴

製一兩半

紫蘇葉

一兩

右呬咀每服三錢半薑七片棗二枚煎服

桔梗枳殼湯指迷七氣湯分氣散蘇湯

方見
氣門

二陳湯

方見
痰類

安腎圓

方見水
飲門

八味圓養正丹

見癰
冷門

治腎虛上喘凡腎

虛而喘須以人參為佐

五靈圓治久喘

木香

半
兩

馬兜零

去殼
炒

葶藶

微炒各
一分

川五靈脂

二
兩

右為細末煉蜜圓桐子大每二十圓杏仁三箇搥碎

薑三片煎湯下

雄黃圓至誠修合治喘

雄黃

研

白礬

煨

木香

生葶藶

各一分

馬兜零

去殼

雞內金

淡豆豉

各三錢半

信礪

鋒芒瑩者研生研一錢半

右八味各取實分數並細末研米漿煮糊圓如胡椒

大每服五圓茶清稍冷臨臥送下加至七圓而止次

日飲食勿用熱菜豆生嚼解礪霜毒

控痰良方

方見痰飲門

治喘嗽

虛勞喘嗽眩運方

靈砂

一兩研細

人參

木香

各二錢半

大香附

并淨

大紅川椒

去合口并子焙出汗各半兩

右細末糕糊圓麻子大每服二十圓空心食前橘皮

湯下

川椒引氣歸元

附諸方

蘇沉九寶湯

簡易方

治老人小兒素有喘疾遇寒暄不常

發則連綿不已咳嗽嘔吼夜不得睡

桑白皮

甘草

大腹皮

麻黃

官桂

薄荷

陳皮

紫蘇

杏仁

各六分

右吹咀每服三錢水盞半薑三片烏梅半箇煎六分服

五味子湯

活人方

治喘促脉伏而數者

五味子

五錢

人參

麥門冬

去心

杏仁

去皮尖

生薑

陳皮

各一錢半

棗子

三枚

右咬咀作二服每服水二盞煎至一盞食後溫服

四磨湯治七鬱結上氣喘急

人參

檳榔

沉香

烏藥

右件各濃磨水和煎三五沸溫服

千縉湯治痰喘不能卧人扶而坐一服即安

半夏

七箇到
泡七次

甘草

炙一寸

生薑

一指

皂角

一寸

右咬咀作一服水煎

丹溪治痰喘方

南星

半夏

杏仁

瓜蒌仁

香附

陳皮

去白

皂角灰

蘿蔔子

右為末神麴糊為丸每服六七十丸薑湯下

五虎湯治喘急痰氣

麻黃

七分

杏仁

去皮尖
一錢

甘草

四分

細茶

炒八分

白石膏

一錢五分

右作一服白水煎

○風寒傷而喘者三拗湯華蓋散神秘湯可選而用之
○象云止喘氣促以天門冬人參黃耆為主

針灸法璇璣一穴

在天突
下一寸

氣海一穴

在臍下
一寸半

三里二穴

聲音

聲音方論

心為聲音之主肺為聲音之門腎為聲音之根風寒暑濕氣血痰熱邪氣有干於心肺者病在上脘隨證解之邪氣散則天籟鳴矣惟夫腎虛為病不能納諸氣以歸元故氣奔而上咳嗽痰壅或喘或脹髓虛多唾足冷骨痿胸腹百骸俱為之牽制其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也按錢氏方小兒吐瀉利其小便過多以致脾虛不受錢用益黃散作效數日

以後忽爾不語錢知其脾氣已復腎氣尚虛投以地黃
圓益腎相繼數劑於是能言余益信聲音之根出於腎
也不誣矣○諸病不語或聲乾沉難以痊復餘見活人
總括小兒疳瘕見小兒類

聲音證治

星薑飲治風邪風毒纏喉不語

南星

畧炮
半兩

生薑

四錢

橘皮

三錢

右剉每服三錢紫蘇五葉煎服

荊蘇湯失音通用

荊芥

蘇葉

木通

橘紅

當歸

桂

石菖蒲

右等分剉煎四錢服

金沸草散人參欬花膏魚服治傷風鼻塞涕流壅嗽聲

啞熱證通用

方見
嗽門

二物湯治風寒邪氣留滯失音

辣桂

半兩

石菖蒲

二錢

右剉每服二錢半新水煎細呷

歸荊湯治風痙口噤不語項強背直身腰反張

方附在濕門

小柴胡湯治伏暑發熱汗渴暑入心胞不語

方見血類

加茯苓煎

苓煎

不換金正氣散

方見寒類

加石菖蒲治濕證聲啞加桂治寒

證聲啞

三因七氣湯

方見氣類

加枳殼甘草治氣隔聲沉

犀角地黄湯治血證心忪語短眩冒迷忘

生地黃

四兩淨

犀角

牡丹皮

芍藥

各半兩

右剉每服四錢入桃仁去皮尖七粒煎服如無犀角

以升麻代

硃砂圓治打撲驚忤血入心竅不語

方見血類

二陳湯

方見飛類

加石菖蒲煎吞白圓子

方見身疼類

治痰證聲

沉

金匱要略卷八
金花散治失音亦治喉痺

槐花新瓦上炒香熟三更後床上仰臥隨意食之熱

證通用

密陀僧散治大驚入心痰血室塞瘖不能言亦治瘡風

方見驚悸門

治蜜桃仁湯治狐惑虫食其臍上唇瘡其聲啞

桃仁

浸去皮焙

槐子

艾葉

各一兩

大棗

十五枚

右用水三盞煎至一盞半分三次服

人參平補湯治腎虛聲不出

人參

川芎

當歸

熟地黄

洗曬

白芍藥

白茯苓

兎絲子

酒浸爛研細

北五味子

杜仲

去麋皮剉薑汁製炒去絲

巴戟

酒浸去心曬

橘紅

半夏麴

各半兩

牛膝

酒浸焙

白朮

補骨脂

炒

葫蘆巴

炒

益智仁

甘草

炙各二錢半

石昌蒲

一錢半

右剉細每服三錢薑五片棗二枚令前煎吞山藥圓

七十粒

方見濁門

五更頭腎氣開不得咳唾言語默然

再進上藥功效勝常

杏仁煎治咳嗽暴重聲音不出

杏仁

水浸去皮研膏

冬蜜

砂糖

薑汁

各一盞

桑白皮

去赤炒

木通

貝母

去心各一兩半

北五味子

紫苑茸

各一兩

石昌蒲

半兩

款冬花並

右後六味剉以水五升煎半去滓入杏薑糖蜜夾和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之

木通湯治諸風失音

木通

石昌蒲

防風

羌活

桑螵蛸

全蝎

焙

直僵蠶

炒

甘草

炙各一分

圓白南星

畧炮半兩

右剉每服二錢半煎蘇五葉薑五片熱煎服

附諸方

訶子湯治失音不語

訶子

四箇半
生半煨

桔梗

一兩五錢
半生半炒

甘草

二寸一寸
生一寸熟

右為粗末分二貼每貼水一盞童便一盞煎至八分去滓食後溫服

玉粉圓治冬月寒痰結於咽喉不利語音不出鍼經云寒氣客於會厭卒如瘕宜服此藥

桂心

草烏

各一字

半夏

湯洗
五錢

右為細末薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一九至
夜含化多年不愈者亦効

響聖破笛丸治歌謳失音不語者宜服神効

連翹

桔梗

甘草

各二兩半

薄荷

四兩

訶子肉

炒

砂仁

大黃

各一兩

川芎

一兩半

白藥煎

二兩

右為細末雞子清和為丸如彈子大每用一九臨臥

噙化服

一方治失音不語

百藥煎

杏仁


去皮尖

百合

訶子肉

薏苡仁

各等分



右為末以雞子清和圓如彈子大每用一圓臨臥噉

仁齋直指卷八